

Plan de prophylaxie simplifié : Poulets, Pintades, Canards, Oies

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Semaine 1	Levures (types FLORISTIUM ou KANNE) ou vinaigre (4 ml/litre d'eau)						
Semaine 1	Vitamines AD3 E et oligoéléments						
Semaine 2							
Semaine 3					Traitement COCCIDIOSE (J19 à J24)		
Semaine 4							
Semaine 4			Vitamines AD3 E et oligoéléments (J24 à J29)				
Semaine 5	Vitamines AD3 E et oligoéléments						Vermifuge J35
Semaine 6							
Semaine 7			Traitement COCCIDIOSE (J45 à J50)				
Semaine 8							
Semaine 8	Vitamines AD3 E et oligoéléments (J50 à J55)						
Semaine 9							
Semaine 10							Vermifuge J70
Semaine 11							
Semaine 12			Vitamines AD3 E et oligoéléments (J24 à J84)				
Semaine 13							
Semaine 14							
Semaine 15							Vermifuge J105
Semaine 16							
Semaine 17							

Anti-coccidiose:

EMERICOX (phytopathique)
ou ANTICOX (phytopathique)
ou PROTOCURINE (homéopathique)
NB : le vinaigre peut être utilisé tout au

Vermifuge :

LEVANISOLE (1 J de traitement) (allopathique)
ou PHYTO REGUL (3 J de traitement) (phytopathique)
ou BONEHELMA (3 J de traitement) (homéopathique)